

- **Etude Youbicier**, Montpellier, France, **1998** : *Des embryons de poulets sont exposés à des champs électromagnétiques GSM. 72 % meurent contre 12 % pour le groupe témoin.*
- **Etude Santini**, France, **2002** : *530 habitants ont répondu à un questionnaire reprenant 18 symptômes de maladie des radiofréquences. Les symptômes sont corrélés à la distance à la station relais de téléphonie mobile : A moins de 10 m, nausées, perte d'appétit, perturbations visuelles. A 100 m, irritabilité, tendance dépressive, baisse de la libido. A 200 m maux de tête, perturbations du sommeil. A 200-300 m, fatigue.*
- **Etude Salford**, Suède, **2003** : *les micro-ondes pulsées sont la cause d'une fuite d'albumine à travers la barrière sang-cerveau.*
- **Etude Grigor**, Russie, **2003** : *Chez des embryons de poulet exposés à des champs émis par des portables, la mortalité a augmenté à 75% contre 16% dans le groupe témoin.*
- **Etude Navarro**, Espagne, **2003** : *Les riverains d'antennes relais (puissance de l'ordre de 0,4 V/m) .ont : tendance dépressive, fatigue, perturbations du sommeil, difficultés de concentration, problèmes cardiovasculaires, nervosité, douleurs articulaires, problèmes psychogénératifs.*
- **Etude Löscher**, Bavière, **2003** : *Sous l'effets des antennes-relais, On observe chez les bovins une forte augmentation du nombre de fausses couches, une augmentation des conjonctivites et d'autres affections, une modifications du comportement, une baisse de la production laitière.*
- **Etude Dovrat**, Israël, **2004** : *Il est démontré que l'exposition à quelques mW à 1 GHz pendant plus de 36 h affecte la fonction optique du cristallin. Si l'exposition est interrompue, on observe macroscopiquement une guérison. Mais en microscopie l'impact de rayonnement persiste.*
- **Etude Meo**, Arabie Saoudite, **2005** : *Une association est démontrée entre l'utilisation de téléphones mobiles et des troubles auditifs et visuels.*
- **Etude Stever**, Allemagne, **2005** : *Changement comportemental des abeilles sous une exposition électromagnétique type mobile. Cette étude montre une perte de production de miel dans les ruches exposées et l'abandon de ces dernières par les abeilles.*
- **Etude Sanggyu**, Chicago USA, **2005** : *Les champs radiofréquence à 2,45 GHz peuvent modifier l'expression des gènes dans les cellules humaines in vitro par un mécanisme non thermique.*
- **Etude Oberfeld**, Autriche, **2005** : *L'exposition à une antenne-relais située à 80 mètres (env. 1 V/m) perturbe les courants électriques du cerveau, mesurés par l'électroencéphalogramme.*
- **Etude Balmori**, Espagne, **2005** : *Baisse de 50% de la fertilité des cigognes blanches, pour des nids situés à moins de 200 m des antennes par rapport à ceux situés à plus de 300 m*
- **Etude Abdel-Rassoul**, Egypte, **2006** : *Comparés à des personnes non exposées, celles qui vivent à proximité d'une antenne-relais (expositions de l'ordre de 0,2 V/m) manifestent les symptômes suivants : maux de tête, troubles de la mémoire, vertiges, tremblements, symptômes dépressifs, troubles du sommeil, moindres performances en résolution de problème.*
- **Etude Sadetzki**, Israël, **2007** : *Association démontrée entre l'utilisation de téléphone portable et les tumeurs de la glande parotide.*
- **Etude Ledoigt**, Clermont-Ferrand, **2007** : *Des plants de tomates sont exposés à des valeurs de champ de 5 V/m à 900 MHz pendant 5 à 15 minutes. On observe des effets biochimiques comparables à ceux que l'on observe à la suite d'un choc ou d'une blessure.*
- **Etude Wdowiak**, Pologne, **2007** : *Augmentation du pourcentage des spermatozoïdes de morphologie anormale, corrélée avec la durée de l'exposition aux ondes émises par les téléphones GSM*
- **Etude Oberfeld**, Autriche, **2008** : *augmentation significative des cas de cancers dans un rayon de 200 mètres autour des antennes-relais en émission.*
- **Etude Nittby**, suède, **2008** : *Diminution significative de la mémoire chez les rats après une exposition micro-ondes par GSM*
- **Etude Divan**, Danemark, **2008** : *sur 13 159 enfants, on observe davantage de troubles du comportement chez les enfants exposés au téléphone portable pendant leur vie intra-utérine et après leur naissance.*
- **Etude Augner**, Autriche, **2008** : *Sur 57 personnes exposées 50 minutes à 0.04 0.24 ou 0.9 V/m, apparition d'un effet sur le bien-être dans le groupe le plus exposé.*
- **Etude Hardell**, méta-analyse internationale, **2008** : *Doublement du risque de gliome cérébral du côté exposé au portable pendant 10 ans et multiplication par 2,4 du risque de neurinome du nerf acoustique.*
- **Etude Hallbergh**, suède, **2009** : *Les ventes de somnifères aux moins de 19 ans ont augmenté d'un facteur 100 depuis l'apparition de la 3G.*
- **Etude Del Vecchio**, Italie, **2009** : *Observation d'une perturbation de la maturation des cellules nerveuses de souris sous un champ de radiofréquence à 900 MHz et 1 W/Kg*
- **Etude Panda**, Inde, **2010** : *L'utilisation à long terme de téléphones portables entraîne des lésions de l'oreille interne.*